

«Антиклещ»

Программа «Антиклещ» разработана в целях обеспечения Застрахованных высококвалифицированной медицинской помощью, направленной на профилактику и лечение клещевого энцефалита, на лечение других заболеваний, передающихся иксодовым клещом: системного боррелиоза (болезни Лайма), микст-инфекций, клещевого эрлихиоза, на профилактическую иммунопрофилактику.

Программа предусматривает следующие виды услуг:

- Осмотр врача с отметкой об отсутствии противопоказаний к применению вакцины, при строгом соблюдении Инструкции, прилагаемой к препарату, и санитарно-противоэпидемиологического режима;
- Введение вакцины с отметкой о введении вакцины с указанием даты, серии и дозы препарата;
- Амбулаторно-поликлиническую помощь в случае укуса клеща:
 - приемы врачей-специалистов (включая манипуляции по удалению клеща);
 - диагностические лабораторные и инструментальные исследования (исследования крови на клещевой энцефалит, системный боррелиоз, клещевой эрлихиоз; исследование клеща на клещевой энцефалит);
 - проведение профилактических мероприятий, в том числе введение иммуноглобулина в целях предотвращения клещевого энцефалита.
- Стационарную помощь по экстренным показаниям: при заболеваниях клещевым энцефалитом, клещевым системным боррелиозом, микст-инфекцией, клещевым эрлихиозом, возникших в результате укуса клеща или контакта с клещом.

В дополнение к ст. 14 Правил, не является страховым случаем по программе «Антиклещ» и не оплачивается Страховщиком:

- осложнения в месте присасывания клеща, в случае удаления его вне медицинских организаций;
- местные и общие осложнения после иммунизации (эти осложнения являются индивидуальной реакцией организма на иммуноглобулин и требуют неотложной медицинской помощи за счет средств ОМС);
- обращение Застрахованного за иммунизацией или стационарным лечением позднее 72 часов с момента присасывания клеща;
- обращение Застрахованного за стационарной помощью при отсутствии или несвоевременно проведенной иммунизации;
- Заболевание лиц, не прошедших курс вакцинации или добровольно отказавшихся от введения необходимой дозы вакцины;
- Заболевание клещевым энцефалитом, наступившее ранее 15 суток после второй вакцинации;